




# Gebruiksaanwijzing

## Vorzetkamer Aerochamber® met groot masker


\*Voorbereiding bij nieuwe inhalator (puffer), zie volgende pagina.




- Stap 1. Zorg dat uw mond leeg is.
- Stap 2. Haal de beschermdop van uw inhalator (puffer).
- Stap 3. Schud de inhalator (puffer) krachtig. Als u de inhalator 1 week of langer niet heeft gebruikt, spuit dan 1 puf weg.




- Stap 4. Plaats de inhalator (puffer) met de opening naar beneden in de voorzetkamer.



- Stap 5. Houd de voorzetkamer met het masker naar u toe (horizontaal).
- Stap 6. Ga rechtop zitten of staan, houd uw hoofd iets achterover.
- Stap 7a. Zet het masker goed aangesloten op uw gezicht over mond en neus.
- Stap 7b. Adem uit door de voorzetkamer. Doe dit langzaam en volledig.



- Stap 8. Druk de inhalator 1 keer in.



- Stap 9. Adem 5 keer rustig in en uit door de voorzetkamer. Het klepje van het ventielsysteem gaat tijdens het in- en uitademen heen en weer. Het masker goed aangesloten houden.

- Stap 10. Heeft uw arts meer dan 1 pufje per keer voorgeschreven, haal dan de inhalator (puffer) uit de voorzetkamer. Herhaal stap 3 t/m 9. Spuit niet meer dan één pufje per keer in de voorzetkamer.
- Stap 11. Haal de inhalator (puffer) uit de voorzetkamer, zet het beschermdopje terug.
- Stap 12. Spoel uw mond en keel met water: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken.

# Gebruiksaanwijzing Voorzetkamer Aerochamber® met groot masker

**\*Voorbereiding: de eerste keer een nieuwe inhalator (puffer) gebruiken.**

**Nieuwe inhalator (puffer):** schudden en 3 pufs wegsputten in de lucht. Dit is nodig om al het drijfgas weg te spuiten, zodat er voldoende medicijn vrij komt. Ga verder met stap 1, zie vorige pagina.

## Over uw medicijn (in te vullen door uw zorgverlener)

Naam van het medicijn: .....

Hoe vaak per dag / tijdstip inhaleren: .....

Volgorde van inhaleren (bij meerdere medicijnen): .....

## Dit medicijn is een:

- Luchtwegverwijder (zorgt voor makkelijker in en uit ademen)
- Ontstekingsremmer (nodig bij astma en soms bij COPD, beschermt de longen en houdt ze langer in goede conditie)
- Combinatiemedicijn:
  - Ontstekingsremmer en luchtwegverwijder
  - Twee soorten luchtwegverwijders

## Tips en informatie

1. Bent u niet in de gelegenheid om uw mond te spoelen na gebruik inhalator (puffer), dan kunt u ook iets eten of drinken.
2. Er zijn verschillende manieren om bij te houden wanneer uw puffer leeg is. Op de zijkant van de verpakking staat hoeveel pufjes er in zitten. U kunt noteren wanneer u met de puffer start. Of u kunt elk pufje (op papier) bijhouden, zodat u kunt uitrekenen wanneer u een nieuwe moet bestellen. Doe dit tijdig.
3. Maak 1 keer per week uw voorzetkamer schoon. Haal de voorzetkamer uit elkaar. Laat daarbij het masker vastzitten aan het voorstuk (zie tekening bovenaan vorige pagina). Was de losse onderdelen in een schoon, lauw, afwassopje. Spoel de voorzetkamer af en droog hem niet af, maar laat hem aan de lucht drogen. Dit is nodig, omdat anders het medicijn niet in de longen terecht komt, maar neerslaat op de zijkanten van de voorzetkamer.'
4. Bewaar de inhalator (puffer) op een droge plek op kamertemperatuur.
5. Vervang de voorzetkamer Aerochamber® met groot masker 1 keer per jaar.
6. Meer weten over de werking van uw medicijn of over bijwerkingen? Lees de bijsluiter. U vindt deze bij uw medicijn.
7. Goed tanden poetsen is extra belangrijk als u medicijnen inhaleert. Het voorkomt tandbederf.

Blijf uw medicijnen gebruiken zoals uw arts heeft voorgeschreven. Doet u dat niet, dan worden uw longen minder gezond.

Heeft u vragen of problemen? Ga naar uw huisarts, praktijkverpleegkundige/-ondersteuner, longarts, longverpleegkundige of apotheker.

Laat één keer per jaar controleren of u nog goed inhaleert.

Bekijk voor meer informatie het filmpje van de Aerochamber® met groot masker op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl).